

Diam. 3,1, alt. 3,2 mm.

Touranne.

Es ist sehr schwierig, bei diesen kleinen Arten bestimmte Unterschiede hervorzuheben; ich kann nur sagen, dass ich unter meinem reichen Material aus China, Hinterindien und Indonesien keine Art finde, mit welcher diese Form combinirt werden könnte.

8. *Hemiplecta platytaenia* n. sp.

T. modice sed aperte umbilicata, depressa, solidula, sat distinete plicato-striata, lineis spiralibus valde confertis oblique antrorum decurrentibus sculpta, olivacea, superne taenia castanea latiuscula, infra peripheriam altera perlata ornata. Anfr. $5\frac{1}{2}$ sat celeriter accrescentes, convexiusculi, ultimus ad peripheriam subcarinatus, antrorum sat dilatatus. Apertura valde obliqua, elliptica, modice excisa; peristoma rectum, obtusum, margo columellaris superne breviter reflexus.

Diam. maj. 61,5, min. 50, alt. 40, apert. lat. 34, long. 30, alt. 25 mm.

Touranne.

Von H. neptunus Pfr. verschieden durch die flachere Gestalt, Färbung und Bänderung, die peripherische Kante, welche fast zu einem Kiel entwickelt ist, und die raschere Zunahme der Windungen. (Schluss folgt.)

Ueber einige Landschnecken aus dem südwestl. Marokko.

Von

Prof. E. v. Martens.

Durch Pastor Kleinschmidt sind dem Berliner Museum aus der Gegend um Marrakesch, einem bis jetzt conchyliologisch noch unbekannten Landstrich, die folgenden Arten zugekommen:

Parmacella Deshayesi Moq. Tand. Achmar und Doukkala, ersteres $1\frac{1}{2}$ Tagmärsche südöstlich von Safej.

Helix (Caracollina) lenticula Fer. Doukkala. Diese Art ist in dem neuesten Verzeichnisse der marokkanischen Landschnecken von Pallary Journ. de Conch. XLVI 1898 nicht erwähnt.

- (*Xerophila*) *alberti* Kobelt, Colomiesiana Mouss., non Bourg., nach Dr. Kobelt's Bestimmung. Doukkala und Achmar.
 - (*Xeroleuca*) *subsuta* n. Bouslaffen. Beschreibung s. u.
 - — *Mogradina* Morelet. Drenkat und Bouslaffen.
 - — *tureica* Chemn. Achmar.
 - (*Euparypha*) *delinei* Rossin. Bouslaffen.
 - (*Macularia*) *lactea* Müll.. var. *punctata* Müll. (*myriostigma* Bourg.) Drenkat.
 - — *grossularia* n. Drenkat, Beschreibung s. u
- Rumina decollata* L. Drenkat und Doukkala.
- Ferussacia mabilleana* Paladilhe var. Pallary Journ. de Conch. 1898 pl. 9 fig. 5. Doukkala.

Helix (Macularia) grossularia n.

Testa imperforata, globosa, laevis, opaca, fuseescens, punctis albis incrassatis et fasciis parum distinctis rufofuscis 4 pista; spira convexo-depressa, apice obtuso laevigato; anfr. $4\frac{1}{2}$, convexiusculi, sutura superficiali juncti, ultimus supra et infra subaequaliter inflatus, antice valde deflexus: apertura perobliqua, subelliptica, parum excisa peristomate leviter patulo, crassiusculo, flavidio-albido, intus fuscolimbato, marginibus appropinquatis, externo valde arcuato, marg. columellari stricto, non expanso, fusco, sulco impresso limitato; margine parietali fusco.

Diam. maj. 19, min. 15. alt. 12, apert. diam. 10, lat. incl. peristomate $9\frac{1}{2}$ mm.

Südwestliches Marokko, bei Drenkat, 2 Tagesmärche südlich von Marrakesch.

In Grösse und Gestalt an die Gruppe *Allognathus* erinnernd, aber nach der Bildung des Columellarandes und der Färbung zur Gruppe der *H. lactea* gehörig, innerhalb welcher sie die kleinsten und am meisten kugelige Art sein durfte.

Helix (Xeroleuca) subsuta n.

Testa peranguste umbilicata, subconico-lenticularis, subtiliter rugulosa, pallide griseo-flavescens, saepius maculis fuscis subquadratis supra carinam pieta vel basi unifasciata; anfr. $5\frac{1}{2}$, subplani, spiram obtuse conoideam formantes, ultimus ad carinam dilatato-expansus, carina acuta, subirregulari, antice vix descendens, infra prope carinam paulum excavatus, dein versus umbilicum leviter convexus; apertura securiformis, sat obliqua, extus acumino-rostrata, peristome recto, acuto, margine supero striato, infero bene arcuato.

Diam. maj. $19-20\frac{1}{2}$; min. $17-18$, alt. $7\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}$, apert. diam. $8\frac{1}{2}-10$, lat. (alt. obliqua) 7—8 mm.

Südwestliches Marokko, bei Bouslaffen, 1 Tagmarsch nordwestlich von Marrakesch. Nächstverwandt mit *H. lacosteana* Morel., aber mit viel engerem Nabel.

Subsuta, nach unten angeflickt, wegen der wie eine Falbel vorspringenden und abwärts hängenden Kielplatte, nach Horaz serm. I, 2, 29 „subsuta instita veste“.

Literatur.

Putzeys, Dr.. *Diagnoses de quelques espèces et d'un Sous-genre nouveau provenant de l'état independant du Congo.* — In Bull. Séances Soc. mal. Belgique 1899. p. LV.

Neu *Cyclophorus rugosus* p. 55 fig. 1, Manyema; — *Streptaxis micans* p. 55 f. 2, ibid.; — *St. nseudwensis* p. 55 fig. 3, ibid.; — *Ennea nyangwensis* p. 56 fig. 4, ibid.; — *E. albida* p. 5⁶